

Zofran® - gir deg og pasienten
større valgfrihet

Stråleindusert emesis og kvalme er ikke så intens
som for eksempel cisplatin induisert
emesis og kvalme, men:

- Strålebehandling er ofte langvarig.
- Strålebehandling medfører ofte diare.
- Strålebehandling kan gi emesis og kvalme.

Sammen kan dette gi dårlig ernæringsstatus!

ONDANSETRON
ZOFRAN®

Referanser:

1. Dicato MA, Medical Management of Cancer Treatment Induced Emesis
1998; ISBN 1-85317-267-7: s 103-31.
2. Ref. Felleskatalogtekst 2003.

GSK 05/2004

Stråleindusert emesis og kvalme

- et oversett problem?



*I fremtiden vil flere kreftpasienter
få tilbud om stråleterapi*

*- vil flere også få tilbud om effektiv emesis profylakse
i forbindelse med behandlingen?*



GlaxoSmithKline




GlaxoSmithKline AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo
Telefon: 22 70 20 00 Telefaks: 22 70 20 04
www.gsk.no - www.zofran.no

Pasientfaktorer:

- Eldre
- Kvinner
- Angst ▲▲
- Reisesyke ▲▲

Behandlingsfaktorer:

- Høy dose
- Mange fraksjoner
- Store felt
- Tidligere neg. erfaring



Helkroppsbestråling

Stråledag: 8 mg Zofran i.v. 15 min. før start, evt. tillegg av dexametason 16 mg 5 min. før start.

Påfølgende dager: 8 mg Zofran p.o. x 2, evt. 16 mg Zofran supp. x 1.

Halvkroppsbestråling

Mage/tarm/gynekologisk område inngår i strålefeltet:

Stråledag: 8 mg Zofran i.v. 15 min før start, evt. 8 mg Zofran p.o. 1 time før start.

Påfølgende dag: 10 - 20 mg metoklopramid x 2-3, evt. 8 mg Zofran p.o. x 2.

Mage/tarm/gynekologisk område inngår ikke i strålefeltet:

Stråledag: 10 - 20 mg metoklopramid x 1-2.

Påfølgende dag: Ingen, evt. 10 - 20 mg metoklopramid.

Generell strålebehandling

hvor mage/tarm/gynekologisk område inngår i strålefeltet:

Stråledag 8 mg Zofran i.v. - 15 min før strålebehandling, evt. 8 mg Zofran p.o. 1 time før strålebehandling, evt. 16 mg Zofran supp 1 time før strålebehandling.

Videre oppfølging inntil 2 uker etter avsluttet strålebehandling.